

<b>Биоматериал</b>	<b>Подготовка к взятию/исследованию биоматериала</b>
Кровь	Взятие венозной крови рекомендуется производить натощак или через 3 часа после приема пищи.
Мазок со слизистой оболочки носоглотки	Подготовки не требуется
Мазок со слизистой оболочки ротоглотки	Подготовки не требуется
Слюна	Рекомендуется перед сдачей слюны - провести трёхкратное полоскание полости рта 0,9% раствором натрия хлорида (физ.раствором) или кипяченой водой
Урогенитальные мазки	Подготовки не требуется
	Сбор мочи провести после тщательного туалета наружных половых органов.
	<b>У женщин:</b> перед сбором материала желательно закладывать тампон во влагалище для предупреждения попадания отделяемого из влагалища в мочу
Моча	<b>У мужчин:</b> при мочеиспускании рекомендуется, полностью оттянув кожную складку, освободить наружное отверстие мочеиспускательного канала
	Для исследования отобрать первую порцию утренней мочи в объёме 15,0–30,0 мл в контейнер. У новорождённых и детей грудного возраста допускается сбор мочи с помощью мочеприёмника педиатрического.
Сперма	Сперму собрать после не менее 48 ч полового воздержания, до проведения курса антибиотикотерапии или через 2–3 недели после него в контейнер.
Фекалии, меконий	Взятие фекалий (мекония) произвести из подгузника или предварительно продезинфицированного и промытого от следов дезинфектанта горшка или подкладного судна, на дно которого помещён одноразовый полиэтиленовый пакет. При дефекации нежелательно попадание в судно мочи. Пробы фекалий/мекония необходимо забирать лопаточкой из контейнера.